




【成人】COVID-19 (軽症-中等症 I) 治療フローチャート

- *重症化リスク因子**
- ・高齢者 (>=60歳)
 - ・肥満 (BMI>=25)
 - ・慢性肺疾患/喘息
 - ・脂質異常症
 - ・糖尿病
 - ・鎌状赤血球
 - ・悪性腫瘍
 - ・医療技術への依存 (CPAPなど)
 - ・喫煙
 - ・免疫抑制下
 - ・高血圧
 - ・心血管系疾患
 - ・慢性腎臓病
 - ・神経発達障害
 - ・妊娠後期
- ※ワクチン接種の有無も考慮する

- ・発症3日以内
 - ・12~59歳
 - ・重症化リスクなし
 - ・妊娠の可能性なし
- これらを満たし、さらに**高熱・強い咳・強い咽頭痛**などがある場合で、医師が必要と認めるとき



	≥ 60	$30 \leq \sim < 60$	< 30 or 透析	
1st 推奨	パキロビット600* (内服)	パキロビット300* (内服)	ラゲブリオ (内服)	パキロビット* 300または600 (内服)
2nd 推奨	ベクルリー (3日間点滴)	ベクルリー (3日間点滴)	ゼビュディ (単回点滴) 上記が使用できないとき	ベクルリー (3日間点滴)
3rd 推奨	ラゲブリオ (内服) ゼビュディ (単回点滴) 上記が使用できないとき	ラゲブリオ (内服) ゼビュディ (単回点滴) 上記が使用できないとき		ゼビュディ (単回点滴) 上記が使用できないとき

対症療法
±
ゾコーバ* (内服)

一般に、重症化リスク因子のない軽症例の多くは自然に改善するため、対症療法で経過を見ることができると考えられる。ゾコーバの投与は、症状を考慮した上で投与を判断する。

*パキロビット及びゾコーバは併用禁忌薬が多いため、処方する前に患者の内服薬を確認し薬剤部へ連絡して下さい
** 発症7日以内かつ重症化リスク因子あればベクルリー投与可


†病状の進行が予期される場合も含む



【小児】COVID-19 (軽症-中等症 I) 治療フローチャート

- *重症化リスク因子**
- ・高齢者 (>=60歳)
 - ・肥満 (BMI>=25)
 - ・慢性肺疾患/喘息
 - ・脂質異常症
 - ・糖尿病
 - ・鎌状赤血球
 - ・悪性腫瘍
 - ・医療技術への依存 (CPAPなど)
 - ・喫煙
 - ・免疫抑制下
 - ・高血圧
 - ・心血管系疾患
 - ・慢性腎臓病
 - ・神経発達障害
 - ・妊娠後期
- ※ワクチン接種の有無も考慮する

- ・発症3日以内
 - ・12歳以上
 - ・重症化リスクなし
 - ・妊娠の可能性なし
- これらを満たし、さらに**高熱・強い咳・強い咽頭痛**などがある場合で、医師が必要と認めるとき



*パキロビット及びゾコーバは併用禁忌薬が多いため、処方する前に患者の内服薬を確認し薬剤部へ連絡して下さい
 ** 発症7日以内かつ重症化リスク因子あればベクルリー投与可

†病状の進行が予期される場合も含む