

自動車の運転等危険を伴う作業について注意喚起が求められる医薬品一覧

この一覧は、添付文書上に自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業について記載がある薬剤です。添付文書上の記載内容をもとに、患者の状態や併用薬、生活状況などを考慮の上、説明・指導を行って下さい。

《 運転禁止薬 》

『警告』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類	区分	商品名	一般名	警告
116	注射	アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ塩酸塩水和物	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあるので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明すること。本剤投与中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	ビ・シフロール錠0.125mg・0.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	ミラベックスLA錠0.375mg・1.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	外用	ニュープロパッチ4.5mg・9mg・13.5mg	ロチゴチン	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	レキップ錠1mg	塩酸ロビニロール	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	レキップCR錠2mg	塩酸ロビニロール	前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こした例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
617	内用	ブイフェンド錠50mg・200mg	ポリコナゾール	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	注射	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。

【運転注意薬】

『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
112	内用	ベンザリン細粒・5mg錠	ニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ネルボン錠10mg	ニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	トリアゾラム錠0.125mg・0.25mg「テバ」	トリアゾラム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	サイレース錠1mg・2mg	フルニトラゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	セレナル錠10	オキサゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	セルシン散1%・2mg・5mg錠	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	レキソタン錠2	プロマゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	レスミット錠5	メダゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	グラダキシシン錠50	トフィソパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	コントロール錠5mg	クロルジアゼポキシド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ドラル錠15	クアゼパム	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	外用	セニラン坐剤3mg	プロマゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	フェノバル散・30mg錠・エリキシル	フェノバルビタール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	リスミー錠1mg・2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg・10mg「EE」	ゾルピデム酒石酸塩	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。	
113	内用	クランポール末	アセチルフェネトライド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	アレビアチン散10%・100mg錠	フェニトイン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ヒダントール錠25mg	フェニトイン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	アレビアチン注250mg	フェニトイン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	ホスライン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ミノアレ散66.7%	トリメタジオン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
113	内用	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	ブリミドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	テグレート細粒50%・200mg錠・100mg錠	カルバマゼピン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	リボトリール細粒0.1%・0.5mg錠	クロナゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	デパケン錠100mg・200mg・シロップ	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	デパケンR錠100mg・200mg	バルプロ酸ナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	エクセグラン散20%・錠100mg	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	マイスタン細粒1%・5mg錠・10mg錠	クロバザム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ガバペン錠200mg・400mg	ガバペンチン	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	トピナ錠50mg	トピラマート	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ラモクタール錠小児用2mg・5mg・錠25mg	ラモトリギン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	イーケプラ錠500mg・ドラインシロップ	レベチラセタム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ヒダントールF配合錠	フェニトイン フェノバルビタール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用	フィコンバ錠2mg	ペランパネル水和物	めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないように注意すること。	

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
114	内用	インドメタシンカプセル25「イセイ」	インドメタシン	眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシル	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	外用	インドメタシン坐剤25「イセイ」	インドメタシン	眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	モービック錠10mg	メロキシカム	眠気の調節障害、眠気等の精神神経系症状があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
	内用	トラムセット配合錠	アセトアミノフェン トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
	注射	トラマール注100	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
	注射	ソセゴン注射液15mg・30mg	ベンタゾシン	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	注射	レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	外用	レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告されている。
116	内用	シンメトレル細粒10%・50mg錠	アマンタジン塩酸塩	めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	アキネトン細粒1%・1mg錠	ビペリデン塩酸塩	眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	注射	アキネトン注射液5mg	ビペリデン	眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	ドバストン散98.5%	レボドパ	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	注射	ドバストン静注25mg	レボドパ	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	めまい、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプテンメシル塩酸塩	著しい血圧下降、前兆のない突発的睡眠、傾眠があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	ペルマックス錠50μg・250μg	ペルゴリドメシル塩酸塩	前兆のない突発的睡眠、傾眠がみられることがあるので、自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
	内用	エフビーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	めまい、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	カバサール錠0.25mg・1mg	カベルゴリン	前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧がみられることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
	内用	トレリーFOD錠25mg	ゾニサミド	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	前兆のない突発的睡眠、睡眠発作、起立性低血圧、傾眠、めまい、意識消失、失神等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所作業等、危険を伴う作業に従事させないように注意すること。
	内用	マドパー配合錠	ベンセラジド塩酸塩 レボドパ	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	ドバコール配合錠L100・50	カルビドパ水和物 レボドパ	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	内用	スタレボ配合錠L50・100	エンタカボン カルビドパ水和物 レボドパ	前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。
	117	内用	コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩
内用		ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
注射		コントミン筋注25mg	クロルプロマジン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ヒルナミン細粒10%・錠25mg	レボプロマジンマレイン酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
注射		ヒルナミン筋注25mg	レボプロマジン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		アナフラニール錠10mg・25mg	クロミプラミン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		トフラニール錠10mg・25mg	イミプラミン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
注射		アナフラニール点滴静注25mg	クロミプラミン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		トリプタノール錠10・25	アミトリプチリン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ルジオミール錠10mg・25mg	マプロチリン塩酸塩	めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
内用		コンサータ錠18mg・27mg・36mg	メチルフェニデート塩酸塩	めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
内用		リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ドグマチール錠100mg	スルピリド	ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		リーマス錠100・200	炭酸リチウム	めまい、ねむけ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
117	内用	アタラックス-P錠10%・シロップ・カプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないように注意すること
	内用	セレネース細粒1%・0.75mg錠・1.5mg錠・内服液	ハロペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	オーラップ細粒1%・1mg錠	ピモジド	ときに眠気、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	デパス錠0.5mg・1mg	エチゾラム	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	インプロメン錠1mg	ブロムペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	バルネチール錠100	スルトブリド塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	テシプール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	リスパダール細粒1%・0.05錠1mg・2mg	リスペリドン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	眠気、意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	セロクエル25mg錠・100mg錠	クエチアピンフマル酸塩	本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ジプレキサ錠5mg・10mg	オランザピン	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ジプレキサザイディス錠5mg	オランザピン	傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール水和物	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ストラテラカプセル5mg・10mg・25mg	アトモセチン塩酸塩	眠気、めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	リフレックス錠15mg	ミルタザピン	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ベグタミン-A配合錠・B配合錠	クロルプロマジン塩酸塩 フェニバルビタール プロメチジン塩酸塩	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
注射	アタラックス-P注射液25mg/ml・50mg/ml	ヒドロキシジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従事させないように注意すること	
注射	セレネース注5mg	ハロペリドール	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること	
注射	ハロマンス注50mg・100mg	ハロペリドールデカン酸エステル	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること	
118	内用	PL配合顆粒	アリピプラゾール フェニバルビタール プロメチジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること
119	内用	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	サノレックス錠0.5mg	マジンドール	本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	リルテック錠50	リルゾール	本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること
	内用	レミッチカプセル2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること
	内用	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	リリカカプセル25mg・75mg・150mg	プレガバリン	本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。特に高齢者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること
	内用	メマリイOD錠5mg・20mg	メマンチン塩酸塩	通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ベルソムラ錠15mg・20mg	スボレキサント	本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
外用	イクセロンパッチ4.5mg・9mg・13.5mg・18mg	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること	
122	内用	リンラキサー錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	ねむけ、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
124	内用	ブスコパン錠10mg	ブチルスコボラミン臭化物	目の調節障害等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	視調節障害、散瞳等をおこすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。散瞳または視調節麻痺がおこるので、本剤投与中の患者には、散瞳または視調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。また、サングラスを着用するなど、太陽光や強い光を直接見ないように注意すること
	注射	ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物	目の調節障害、眠気、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	注射	アトロピン硫酸塩注0.5mg/タナベ「0.05%シリンジ」(リルモ)	アトロピン硫酸塩水和物	視調節障害、散瞳等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	リオレサール錠5mg	パクロフェン	眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること
	内用	アロフト錠20mg	アフロクアロン	反射運動能力の低下、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること
	内用	ミオナール錠50mg	エベリゾン塩酸塩	本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休業すること。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること
内用	テルネリン顆粒0.2%・錠1mg	チザニジン塩酸塩	反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること	
132	外用	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分指導すること
133	内用	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 ジプロピラミン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること
212	内用	メキシチールカプセル50mg・100mg	メキシチレン塩酸塩	頭がぼーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
212	内用	アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	本剤の投与中に、手指振戦、めまい、ふらつき等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ちに減量又は投与を中止すること(精神神経系の症状は用量依存的に発現しやすい)。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	シペノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	めまい、ふらつき、低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	ピメノールカプセル50mg	ピルメノール塩酸塩水和物	失神、めまい、ふらつき、手足のしびれ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
214	注射	アポロン注0.5mg	レセルピン	眠気、脱力感等を催すことがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
216	内用	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	ゾーミックRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
	注射	イミグラン注3	スマトリプタンコハク酸塩	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
	外用	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないように十分注意すること。
219	内用	ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
222	内用	メジコン散10%・錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	メジコン配合シロップ	クゼゾールスルホナチン酸ナトリウム、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
231	内用	ロベミン小児用細粒0.05%・カプセル1mg	塩酸ロベラミド	眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
232	内用	ドグマチール錠50mg	スルピリド	ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
239	内用	プリンペラン錠5	メクロプラミド	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	プリンペラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド	眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
245	内用	セレスタミン配合錠・シロップ	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ベタメタゾン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
249	内用	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	霧視等の視覚症状があらわれることがあるので、服用中は自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
259	内用	パップフォー錠10・20	プロピペリン塩酸塩	眼調節障害、眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
393	内用	シアナミド内用液1%「タナベ」	シアナミド	注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
429	注射	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	疲労、浮動性めまい、失神、起立性低血圧、霧視が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
441	内用	ベナ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	内用	ピレチア細粒10%・錠25mg	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	ニボラジン錠3mg	メキタジン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	注射	ヒベルナ注25mg	プロメタジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	ボララミン散1%・錠2mg・シロップ	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	内用	ネオマレルミンTR錠6mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
441	内用	ペリアクテン散1%・錠4mg・シロップ	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	眠気を催すことがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	注射	ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
449	内用	ザジテンカプセル1mg・シロップ・ドライシロップ	ケトチフェン fumarate	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	内用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
	内用	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように十分注意すること。
615	内用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg・顆粒2%「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。
625	内用	パリキサ錠450mg	パルガンシクロピル塩酸塩	本剤及び本剤の活性代謝物であるガンシクロピルの投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。
	注射	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロピル	本剤の投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。
639	注射	ベガシス皮下注90µg・180mg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	めまい、錯乱、傾眠、疲労を発現することがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転、機械の操作になるべく従事させないように注意すること。
	注射	ベグイントロン皮下注用50・100・150µg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	めまい、錯乱、傾眠、疲労を発現することがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転、機械の操作になるべく従事させないように注意すること。
799	内用	チャンピックス錠0.5mg・1mg	パレニクリン酒石酸塩	めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
811	内用	アヘンチンキ「第一三共」	アヘン	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	モルヒネ塩酸塩錠10mg・原末	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	MSコンチン錠10mg・30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	オプノ内服液5mg・10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	モルヒネ塩酸塩注射液10mg・50mg・200mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	外用	アンベック坐剤10mg・20mg・30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	コデインリン酸塩散10%「第一三共」	コデインリン酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内用	オキノーム散2.5mg・5mg・10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
811	内用	オキシコドン錠5mg・10mg・20mg・40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	オキファスト注10mg・50mg	オキシコドン塩酸塩水和物	眠気、眩暈が起ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
821	注射	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン塩酸塩	眠気、眩暈が起ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	注射	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニルエン酸塩	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
	外用	フェントステープ1mg・2mg・4mg・6mg・8mg	フェンタニルエン酸塩	眠気、めまいが起ることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	内服	イーフェンバツカル錠50 μ g・100 μ g・200 μ g	フェンタニルエン酸塩	眠気、めまいが起ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

以下〈その他〉

『重要な基本的注意』欄に一定の条件の場合に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
111	注射	プロボフォール1%静注100mL「日医工」	プロボフォール	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
	注射	1%ディプリバン注-キット 200mg20mL・500mg50mL	プロボフォール	本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
	外用	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
112	注射	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	手術・処置後は全身状態に注意し、基本的運動・平衡機能の回復等に基づき帰宅可能と判断できるまで患者を管理下に置くこと。また、鎮静の影響が完全に消失するまでは自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事しないよう、患者に注意すること。
	注射	プレセデックス静注液200μg「マルイン」	デクスメトミジン塩酸塩	全身状態に注意し、手術・処置後は患者が回復するまで管理下に置くこと。なお、鎮静の影響が完全に消失するまでは自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。
114	内用	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	内用	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
	外用	ボルタレンサボ12.5mg・25mg・50mg	ジクロフェナクナトリウム	本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。
117	内用	トレドミン錠15mg・25mg	ミルナシプラン塩酸塩	眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
	内用	サインバルタカプセル20mg・30mg	塩酸デロキシセチン	眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導すること。
131	外用	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
	外用	ネオンネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	本剤を投与した患者には散瞳が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用するなど太陽光や強い光を直接見ないように注意すること。
	外用	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
	外用	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
	外用	サンピロ点眼液1%・2%	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が起こるので、本剤投与中の患者には、縮瞳(暗黒感)又は調節痙攣が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
	外用	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
	外用	タブロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
	外用	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように指導すること。
	外用	ミドリンP点眼液	トロピカミド フェニレフリン塩酸塩	散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。また、サングラスを着用する等太陽光や強い光を直接見ないように指導すること。
	外用	デュオトラバ配合点眼液	テモロールマリン酸塩 トラボプロスト	本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転には従事させないように注意すること。
	217	内用	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド
内用		ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
内用		アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
外用		ニトロールスプレー1.25mg	硝酸イソソルビド	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
外用		フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
外用		ミリステープ5mg	ニトログリセリン	本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用により頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように十分に注意すること。
221	注射	アネキセート注射液0.5mg	フルマゼニル	本剤投与後24時間は危険な機械の操作や自動車の運転等完全な精神的緊張を必要とする仕事に従事させないように注意すること。
392	注射	デスフェール注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	本剤投与中にめまい、視覚・聴覚障害を訴える患者には、本剤投与中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないこと。

薬効分類	区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
424	注射	パクリタキセル点滴静注液30mg・100mg「ホスピーラ」	パクリタキセル	本剤は無水エタノールを含有するため、前投薬で投与されるジフェンヒドรามミン塩酸塩錠とアルコールの相互作用による中枢神経抑制作用の増強の可能性があるため、本剤投与後の患者の経過を観察し、アルコール等の影響が疑われる場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
429	内用	タシグナカプセル200mg・150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
625	内用	アストリックドライシロップ80%	アシクロビル	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないように注意すること。
	内用	パラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	パラシクロビル塩酸塩	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないように注意すること。
	注射	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	アシクロビル	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状態によっては従事させないように注意すること。

『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合は注意させる」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類	薬剤区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
114	内用	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸	めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
	内用	セレコックス錠100mg	セレコキシブ	浮動性めまい、回転性めまい、傾眠等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
	内用	クリアミン配合錠A1.0	イブプロフェンナジベン エルゴメシリン酒石酸塩 無水カフェイン	めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
117	内用	パキシル錠10mg・20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。これらの症状は治療開始早期に多くみられている。
	内用	ジェイゾフト錠25mg	塩酸セルトラリン	眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。
	内用	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシウ酸塩	眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。
119	内用	アリセプトD錠3mg・5mg・10mg	ドネペジル塩酸塩	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
	内用	レミニールOD錠4mg・8mg・12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症患者では運転能力や機械操作能力が徐々に低下し、また、本剤の投与によりめまい、眠気等が起こる可能性があるため、本剤投与中の患者（特に投与開始の数週間）には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意するよう指導すること。
122	注射	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	本剤投与後、脱力感、筋力低下、めまい、視力低下があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
123	内用	トランコロン錠7.5mg	メベンゾラート臭化物	視調節障害を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
	内用	チアトンプラセル10mg	チキジウム臭化物	羞明等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
124	注射	ハイスコ皮下注0.5mg	スコボラミン臭化水素酸塩水和物	眼の調節障害、眠気、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
131	外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド	本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械類の操作や自動車等の運転には注意させること。
	外用	アイファガン点眼液0.1%	プリモニジン酒石酸塩	眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合は注意させること。
212	内用	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	テノミン錠25・50	アテノロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	アロチノロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	注射	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	リスモダンカプセル50mg・100mg	ジソピラミド	めまい、低血糖等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	めまい、低血糖等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
	内用	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
	内用	ベプリコール錠100mg	ベプリジル塩酸塩水和物	めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
213	内用	フルイトラン錠2mg・1mg	トリクロロメチアジド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ヒドロクロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロチアジド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	アルダクトンA細粒10%・25mg錠	スピロラクトン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	注射	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	フロセミド錠10mg・20mg・40mg「NP」	フロセミド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	オイテンシンカプセル40mg	フロセミド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	サムスカ錠7.5mg・30mg	トルパブタン	めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	注射	ラシックス注100mg・20mg	フロセミド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
214	内用	アプレゾリン錠10mg・25mg	ヒドララジン塩酸塩	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれ、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に支障を来すことがあるので注意すること。
	内用	カプトリル錠12.5mg	カプトリル	血圧低下に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者で高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。
	内用	レニベース錠2.5・5	エナラプリルマレイン酸塩	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	セタプリル錠25mg	アラセプリル	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	コバシル錠4mg	ベリンドプリルエルブミン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	アルドメット錠125・250	メチルダパ水和物	投与初期又は増量時に眠気、脱力感等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。
	内用	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	鎮静作用により反射運動等が減弱されることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。
	内用	ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン塩酸塩	本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
内用	ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	ラベタロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。	

薬効分類	薬剤区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
214	内用	ロプレソール錠20mg	メプロロール酒石酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	ワイテンス錠2mg	グアナベンズ酢酸塩	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業には注意させること。
	内用	ベルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ベルジピンLAカプセル20mg・40mg	ニカルジピン塩酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	エブランチルカプセル15mg・30mg	ウラビジル	本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づく立ちくらみ、めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。
	内用	メシル酸ドキサゾシン錠0.5・1・2[MEEK]	ドキサゾシンメシル酸塩	本剤の投与初期又は用量の急増時等に起立性低血圧に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
	内用	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には、自動車の運転等、危険を伴う機械の作業に注意させること。
	内用	カルベジロール錠2.5mg・10mg「サワイ」	カルベジロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期や増量時)には、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。
	内用	アテレック錠5・10	シルニジピン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ニューロタン錠25mg・50mg	ロサルタンカリウム	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	プロプレス錠2・4・8	カンデサルタンシレキセチル	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ディオバン錠40mg・80mg	バルサルタン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	アパプロ錠100mg	イルベサルタン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ミカルディス錠20mg・40mg	テルミサルタン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等、危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	オルメテックOD錠20mg・40mg	オルメサルタンメドキシミル	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	セララ錠25mg	エプレノン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	プレミネント配合錠LD	ヒドロクロロチアジド ロサルタンカリウム	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ユニア配合錠LD・HD	アムロジピンベシル酸塩 カンデサルタンシレキセチル	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ミカムロ配合錠AP・BP	アムロジピンベシル酸塩 テルミサルタン	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	外用	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者(特に投与初期)には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	217	内用	ヘルベッサ錠30	ジルチアゼム塩酸塩
内用		ヘルベッサRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
内用		セバミット細粒1%	ニフェジピン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
内用		ニフェジピンCR錠20mg・40mg「サワイ」	ニフェジピン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
内用		セバミットRカプセル10・20	ニフェジピン	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
内用		コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
内用		アムロジピンOD錠2.5mg・5mg・10mg「EMEC」	アムロジピンベシル酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
219	内用	カデュエット配合錠4番	アトルバスタチンカルシウム水和物 アムロジピンベシル酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
232	内用	コランチル配合顆粒	ジヤクワロピド酸塩 硫酸スルホニウム塩 硫酸マグネシウム	視調節障害、眠気を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
239	内用	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	眠気、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に注意させること。
	内用	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	縮瞳を起こすおそれがあるので、投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機械の操作に注意させること。
	内用	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳を起こすおそれがあるので、投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機械の操作に注意させること。
	外用	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	眠気、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に注意させること。
243	注射	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	起立性低血圧、めまいがあらわれることがあるので、高所での作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
249	内用	サムスカ錠30mg	トルバプタン	めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	注射	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	注射	トルリシティブ下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
259	内用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg・0.2mg「ファイザー」	タムスロシン塩酸塩	めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
	内用	フリバスOD錠75mg・25mg	ナフトピジル	本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい、立ちくらみ等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する人には注意を与えること。
	内用	バイアグラ錠25mg・50mg	シルデナフィルクエン酸塩	臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので自動車の運転や機械の操作に従事する場合には注意させること。
	内用	シアリス錠10mg・20mg	タダラフィル	臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ユリーフ錠4mg	シロドシン	めまいなどがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

薬効分類	薬剤区分	商品名	一般名	重要な基本的注意
259	内用	ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	眼調節障害(霧視等)、傾眠が起こることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。
	外用	ネオキシテープ73.5mg	コハク酸ソリフェナシン	眼調節障害(視力障害、霧視等)、めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤使用中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に注意させること。
339	内用	ドルナー錠20μg	ベラプロスタトリウム	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
392	内用	エクゼイド懸濁用錠125mg・500mg	デフェラシロクス	本剤投与中にめまい、視覚・聴力障害があらわれることがあるので、患者に注意喚起し、本剤投与中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
396	内用	グリミクロン錠40mg・HA錠20mg	グリクラジド	重篤かつ遅延性の低血糖症を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。また、低血糖症に関する注意について、患者及びその家族に十分徹底させること。
	内用	グリメピリド錠1mg・3mg・0.5mg「EMECJ」	グリメピリド	重篤かつ遅延性の低血糖症を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。また、低血糖に関する注意について、患者及びその家族に十分徹底させること。
	内用	メトグルコ錠250mg・500mg	メトホルミン塩酸塩	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。また、低血糖症状に関する注意について、患者及びその家族に十分指導すること。
	内用	ボグリボースOD錠0.2mg0.3mg「タイヨー」	ボグリボース	本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。また、高所作業、自動車の運転等に従事している糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に投与するときには注意すること。
	内用	アクトスOD錠15・30	ピオグリタゾン塩酸塩	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	グルファストOD錠5mg・10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	本剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	セイブル錠25mg・50mg	ミグリトール	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	低血糖及び低血糖症状を起こすおそれがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
	内用	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。
399	内用	ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	投与初期には、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の作業をする際には注意させること。
422	注射	ジェムザール注射用200mg・1g	ゲムシタピン塩酸塩	本剤投与時に傾眠が認められることがあるので、このような症状が発現しないことが確認されるまで、自動車の運転等は行わないように注意すること。
424	注射	ハイカムチン注射用1.1mg	ノゲテカン塩酸塩	易疲労感が発現した場合には、自動車の運転又は機械の操作に注意させること。
429	内用	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	めまい、眠気、霧視等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	アロマジン錠25mg	エキセメスタン	本剤の使用による嗜眠、傾眠、無力(症)及びめまいが報告されており、このような症状がある場合、機械操作や自動車の運転はさせないよう十分注意すること。
	内用	イレッサ錠250	ゲフィチニブ	臨床試験において無力症が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意するよう指導すること。
	内用	フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	疲労、めまい、まれに傾眠が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	めまい、傾眠、意識消失等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	ザーコリカプセル200mg・250mg	クリゾチニブ	視覚障害(視力障害、光視症、霧視、硝子体浮遊物、複視、視野欠損、羞明、視力低下等)があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
	内用	イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド	痙攣発作があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
449	内用	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
	内用	エバステルOD錠5mg	エバステン	眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意させること。
614	内用	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
	注射	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
624	内用	レボフロキサシン細粒10%錠500mg「DSEPI」	レボフロキサシン水和物	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
	内用	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
	注射	クラビット点滴静注500mg/20mL	レボフロキサシン水和物	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
625	内用	ストックリン錠600mg	エファピレンツ	本剤はめまい、集中力障害、嗜眠状態を引き起こすことがある。これらの症状があらわれた場合は、自動車の運転や機械の操作等、潜在的な危険のある労働を避けること。
	内用	ファミビル錠250mg	ファミシクロビル	意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。
629	内用	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
642	内用	ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル	眠気があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作等危険を伴う作業に注意させること。
722	注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	低血糖に基づくめまい、ふらつき、意識障害を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
729	注射	レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
821	注射	アルチバ静注用2mg	塩酸レミフェンタニル	麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転や危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。

『慎重投与』欄に「低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)」と記載のある医薬品

薬効分類	薬剤区分	商品名	一般名	慎重投与
249	注射	アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	イノレット30R注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングルグルゲン(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ノボラピッド注フレックスタッチ、ペンフィル、イノレット、100単位/mLバイアル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ノボリンN注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ノボリンR注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリンヒト(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ヒューマログ注ミリオペン、100単位/mLバイアル	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ランタス注ソロスター	インスリングルグルゲン(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	レベミル注イノレット	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)
	注射	ランタスXR注ソロスター	インスリングルグルゲン(遺伝子組換え)	低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等)