

## 手術後・退院後に使用する薬品（点眼薬）

1.モキシフロキサシン 点眼液	2.オルガドロン点眼液	3.プロナック点眼液
		
抗菌薬 1日4回 1カ月程度	抗炎症薬 1日4回 1カ月程度	消炎鎮痛剤・癒着予防 1日2回 半年程度

- ・1～3の順で使用してください。各目薬の間は5分程度あけてください。
- ・手術した方の目に点眼してください。
- ・4回のうち、それぞれの間隔は3時間以上離してください。
  - ・時間は等間隔でなくて構いません。
  - ・日によって点眼する時間がずれても構いません。
- ・寝る10～15分前には最後の点眼を終わらせるようにしてください。
- ・点眼する際に上まぶたを触らないようにしてください。

### <両目を手術予定の方>

2回目の入院時には、前回処方された点眼薬を持ってきてください。入院中も使用します。

### Q.目にゴミが入ったときはどうしますか

A.モキシフロキサシンを数滴点眼して洗い流してください。それでも取れない場合や薬がなくなってしまった場合は、眼科外来に連絡してください。時間外や休日の場合は救急外来に連絡してください。

### Q.目薬は開封してからどのくらいの期間使えますか

A.開封後1ヶ月を期限の目安としています。1ヶ月経ったら新しいものに替えましょう。未開封であれば、包装に記載されている期限まで保管できます。

### Q.目薬1本はどのくらいの期間で使い切るものなの？

A.上記の目薬は5ml入りでおよそ100滴使用できます。1日4回使用していれば、3～4週間でなくなります。両目であれば半分の期間、10～15日ほどです。