

## 白内障手術前後に使用する薬剤

抗生物質を使用します。かゆみ、発疹、呼吸苦、だるさ、冷や汗、吐き気などが出たらすぐに知らせてください。

<p><b>ソリタT3号 200ml</b></p>	<p><b>術前～</b></p>
	<p>体全体に水分を補給できる輸液製剤です。静脈ルート確保のため、術前から使用します。これにより、術中に薬剤が必要になったとき、直ちに静脈内投与することが可能になります。</p> <p>腎機能やカリウム値によって、1号液や4号液に変更することがあります。</p>
<p><b>セフォセフ1g+生理食塩液100ml</b></p>	<p><b>術前～、当日夜8時ころ 計2回</b></p>
	<p>抗生物質の点滴です。手術後の感染予防のため、術前と当日20時ころ、計2回施行します。</p> <p>アルコール分解抑制を起こすことがあり、頭痛、嘔吐、顔面紅潮など悪酔いのような症状が強く出る可能性があります。少なくとも1週間はアルコールの摂取を避けましょう。</p>
<p><b>ベガモックス点眼液</b></p>	<p><b>手術前日：午後3時、5時、8時 手術当日：午前6時</b></p>
	<p>抗生物質の目薬です。手術後の感染予防のため、術前から点眼します。</p> <p>※手術日に1回使用しているため、お渡ししたときにフタが開いていますが問題ありません。</p>

## 手術後・退院後に使用する薬品（内服薬）

セフジニル 100mg 錠	1日 回 毎食後 1回1錠
	手術後の感染予防のために使用します。 ・食事をとらない場合でも、時間を決めて1日3回服用してください。 ・鉄剤、マグネシウム、アルミニウム含有の薬を飲むときは2時間以上ずらせてください。
ビオフェルミンR 錠	1日 回 毎食後 1回1錠
	抗生物質（セフジニル）による下痢の予防目的で使用します。 ※セフジニルを中止した場合も飲み切ってください

手術翌日の朝から使用します。退院後も続けて飲み切ってください。

下痢がひどい場合はセフジニル錠を中止してください。  
その場合、後日でのよいので、外来もしくは電話で医師に中止したことを伝えてください。

下痢以外で体調がおかしくなったら、眼科主治医に相談してください。



退院後に変わったことがあったら、  
平日（月～金）の8:30～17:00は眼科外来  
平日の17時以降および休日（土日祝）は救急外来  
にご相談ください。

## 手術後・退院後に使用する薬品（点眼薬）

1.ベガモックス点眼液	2.オルガドロン点眼液	3.ジクロード点眼液
		
抗菌薬 1～2か月間	抗炎症薬 1～2か月間	消炎鎮痛剤 約6か月

- ・1～3の順で使用してください。各目薬の間は5分程度あけてください。
- ・手術した方の目に1日4回使用します（※）。
- ・4回のうち、それぞれの間隔は3時間以上離してください。
  - ・時間は等間隔でなくて構いません。
  - ・日によって点眼する時間がずれても構いません。
- ・寝る10～15分前には最後の点眼を終わらせるようにしてください。
- ・点眼する際に上まぶたを触らないようにしてください。

<両目を手術予定の方>

2回目の入院時には、前回処方された点眼薬を持ってきてください。入院中も使用します。

※2回目の手術が終わった後は両目に点眼します。前回の点眼液は回収し、新しいものをお渡しします。

Q.目にゴミが入ったときはどうしますか

A.ベガモックスを数滴点眼して洗い流してください。それでも取れない場合や薬がなくなってしまった場合は、眼科外来に連絡してください。時間外や休日の場合は救急外来に連絡してください。

Q.目薬は開封してからどのくらいの期間使えますか

A.開封後1ヶ月を期限の目安としています。1ヶ月経ったら新しいものに替えましょう。未開封であれば、包装に記載されている期限まで保管できます。

Q.目薬1本はどのくらいの期間で使い切るものなの？

A.上記の目薬は5ml入りでおよそ100滴使用できます。1日4回使用していれば、3～4週間でなくなります。両目であれば半分の期間、10～15日ほどです。